
E
Tableau de coéfficients spectraux (issu d'un champ FA)
∈ E
∈ ET = E²
∈ EI
(a²+b²+c²+d²)
size(EI)=E/4
EI
ELIPS_NRJ :
routine from DATAS_FA module called by ectoplasm
by JD Gril (version 2007.0301)
COEFF
pack(≥0)
On ne travaille qu'avec un quart d'ellipse, d'où ces coéfficients pour représenter l'ellipse
EI = EI * COEFF
MXI2
Abscisse X(x,y) de l'ellipse d'excentricité MNSMAX²/NSMAX² (ici 4/9) pour le « quatuor » (x,y)
On n'alimente l'ellipse 0 que par le « quatuor » (0,0) qui représente l'energie moyenne du champ. Les autres prétendants sont donc distribués sur l'ellipse superieure.
MXI
Contribution de EI à l'ellipse inférieure ou égale
Contribution de EI à l'ellipse superieure
Int()
R(0)
R(1)
R(2)
Energie répartie sur les ellipses entières
IMXI = int(MXI)
Valeur de l'ellipse inférieure



EWN2MN :

routine from DATAS_FA module
called by ectoplasm

by **JD Gril** (version 2007.0301)



VORTI :

routine from DATAS_FA module
called by ectoplasm

by **JD Gril** (version 2007.0301)

DIVERG :

routine from DATAS_FA module
called by ectoplasm

by **JD Gril** (version 2007.0301)